

# Ibuprofeno Farmasierra 50 mg/g gel mentolado

**Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.**

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados debe utilizarse adecuadamente.

- Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días de tratamiento, debe consultar al médico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave, o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

## **Contenido del prospecto:**

1. Qué es Ibuprofeno Farmasierra 50 mg/g gel mentolado y para qué se utiliza.
2. Antes de usar Ibuprofeno Farmasierra 50 mg/g gel mentolado.
3. Cómo usar Ibuprofeno Farmasierra 50 mg/g gel mentolado.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de Ibuprofeno Farmasierra 50 mg/g gel mentolado.
6. Información adicional.

## **1. QUÉ ES IBUPROFENO FARMASIERRA 50 mg/g GEL MENTOLADO Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

Ibuprofeno Farmasierra 50 mg/g gel mentolado es un gel para uso cutáneo (sobre la piel).

El ibuprofeno, principio activo de este medicamento, actúa como analgésico y antiinflamatorio local.

Está indicado para aliviar localmente el dolor e inflamación leves y ocasionales producidos por: pequeñas contusiones, golpes, distensiones (estiramientos de los músculos), tortícolis (dolor en el cuello) u otras contracturas, lumbalgias (dolores en la parte baja de la espalda) y esguinces leves producidos como consecuencia de una torcedura.

## **2. ANTES DE USAR IBUPROFENO FARMASIERRA 50 mg/g GEL MENTOLADO**

**No use Ibuprofeno Farmasierra 50 mg/g gel mentolado:**

- Si es alérgico (hipersensible) al ibuprofeno o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- Si tiene una quemadura solar en la zona afectada.
- Si ha sufrido reacciones alérgicas (rinitis, dificultad para respirar o asma, urticaria, picor u otras) causadas por ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios no esteroidicos.

## **Tenga especial cuidado con Ibuprofeno Farmasierra 50 mg/g gel mentolado**

- No debe utilizarse sobre mucosas, ni sobre piel con heridas o eczemas.
- Si es asmático o alérgico a algún colorante utilizado en alimentación o medicamentos (como por ejemplo: amarillo-anaranjado, tartrazina, etc...) deberá consultar con su médico antes de utilizar este medicamento.
- Debe evitar el contacto con los ojos.
- No debe exponer al sol la zona tratada, ni utilizar con vendajes ni en zonas extensas.
- No debe aplicar simultáneamente Ibuprofeno Farmasierra en la misma zona en la que se hayan aplicado otros medicamentos.

## **Uso de otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, especialmente analgésicos, incluso los adquiridos sin receta médica.

## **Embarazo y lactancia**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

## **Uso en niños**

No utilizar este medicamento en niños menores de 12 años.

## **Conducción y uso de máquinas**

No se ha descrito ningún efecto sobre la capacidad de conducir vehículos y de usar maquinaria cuando se usa externamente sobre la piel.

### 3. CÓMO USAR IBUPROFENO FARMASIERRA 50 mg/g GEL MENTOLADO

Siga estas instrucciones, a menos que su médico le haya dado otras distintas. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

Este medicamento es para uso cutáneo, exclusivamente externo (sobre la piel).

La dosis normal es:

Mayores de 12 años: aplique una fina capa del producto en la zona dolorida, de 3 a 4 veces al día, y realice un ligero masaje para facilitar su penetración. No utilizar más de 7 días seguidos.

Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días de tratamiento, debe consultar al médico.

#### **Si usa más Ibuprofeno Farmasierra 50 mg/g gel mentolado del que debiera**

Debido a su uso externo, no es probable que se produzcan casos de intoxicación. En caso de ingestión accidental, acuda inmediatamente a un centro médico o bien llame al Servicio de Información Toxicológica (Tel: 915 620 420), indicando el medicamento y la cantidad ingerida, ya que se pueden producir: náuseas, vómitos, dolor abdominal, somnolencia, vértigo, espasmos (calambres) y bajada de la tensión arterial.

### 4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, Ibuprofeno Farmasierra 50 mg/g gel mentolado puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Poco frecuentes (observado entre 1 y 10 de cada 1.000 pacientes): enrojecimiento, picor y sensación de quemazón cutánea en la zona de aplicación, que desaparecen al suspender el tratamiento.

Raros (observado entre 1 y 10 de cada 10.000 pacientes): dermatitis (inflamación de la piel) producida por el sol.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave, o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

### 5. CONSERVACIÓN DE IBUPROFENO FARMASIERRA 50 mg/g GEL MENTOLADO

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

No requiere condiciones especiales de conservación.

No use este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase, después de CAD:. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

### 6. INFORMACIÓN ADICIONAL

#### **Composición de Ibuprofeno Farmasierra 50 mg/g gel mentolado**

Cada gramo de gel contiene 50 mg de ibuprofeno como principio activo.

Los demás componentes (excipientes) son: etanol, alcohol isopropílico, hietelosa, dietilén glicol monoetil éter, macroglicéridos de caprilcaproilo, glicerol (E-422), hidróxido de sodio (E-524), mentol, aroma (salicilato de metilo y otros aromas) y agua purificada.

#### **Aspecto del producto y contenido del envase**

Este medicamento es un gel transparente e incoloro.

Se presenta en un tubo que contiene 60 gramos de gel.

#### **Titular de la autorización de comercialización:**

Farmasierra Laboratorios, S.L.  
Ctra. de Irún km 26,200  
San Sebastián de los Reyes 28700 (Madrid)

#### **Responsable de fabricación:**

Farmasierra Manufacturing, S.L.  
Ctra. de Irún km 26,200  
San Sebastián de los Reyes 28700 (Madrid)

**Este prospecto ha sido aprobado en octubre de 2008**